



ВАЖНО!!! КОКЛЮШ

Коклюш — широко распространенное заразное инфекционное заболевание.

Вызывается коклюшевой палочкой, которая передается воздушно-капельным путем от больного человека или носителя бактерии.

Заболевание характеризуется развитием приступообразного мучительного кашля, **вплоть до остановки дыхания**. К осложнениям заболевания относят поражение легких, головного мозга, кровотечения, задержку развития детей после перенесенного коклюша.

Крайне опасно заболевание для недоношенных детей, детей раннего возраста (как правило, заражение происходит от родителей, старших братьев или сестер). В данной возрастной группе лечение проводится в стационаре, нередко в палате интенсивной терапии.

Вакцинация – это лучший метод профилактики коклюша.

АКДС – коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, представляет собой смесь убитых коклюшных микробов и дифтерийного и столбнячного анатоксина (очищенный продукт жизнедеятельности микроорганизмов). Используется для вакцинации и ревакцинации детей до 4 –х летнего возраста, не болевших коклюшем.

Побочные эффекты: местная реакция в виде покраснения или уплотнения, повышение температуры тела, аллергические реакции, крапивница.

Противопоказания:

- острое заболевание (вакцинация возможна через 1 месяц после выздоровления);
- хроническое заболевание (вакцинация проводится во время ремиссии);
- прогрессирующее тяжелое заболевание нервной системы;
- судороги (после консультации невролога);
- сильная реакция на предшествующее введение вакцины (повышение температуры тела выше 40 градусов, отек и гиперемия в месте введения больше 8 см).