



ВАЖНО!!! ПОЛИОМИЕЛИТ

Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, вызывается повсеместно распространенными энтеровирусами, попадая в организм человека через рот. Заразиться можно при контакте с вирусовносителем (**не больным!**), через предметы быта, воду, пищу. Вирус поражает нервную ткань, вызывая параличи (обездвиживание) разных групп мышц. Заболевание может протекать как в виде носительства, так и в более тяжелой форме — паралитической, которая протекает с нарушением речи, глотания, дыхания. Мышечная слабость и параличи, которые сохраняются на долгие годы, а иногда и на всю жизнь, приводят к развитию осложнений со стороны костей: переломам, сколиозам, хронической суставной боли (остеоартрозам). Ухудшают здоровье детей, приводят к инвалидности и смертельным исходам.

Противовирусных средств, эффективно действующих на полиовирус не существует!!!

Главную роль в профилактике заболевания играет вакцинация.

ВИДЫ ВАКЦИН

Инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ)

- По национальному календарю рекомендована для вакцинации и первой ревакцинации, а так же детям с противопоказаниями к ОПВ.
- Содержит убитый вирус.
- Вводится внутримышечно.
- ***Вакцина хорошо переносится!*** После введения может быть уплотнение или покраснение. Редко отмечается повышение температуры, раздражительность или сонливость.
- ***Противопоказания:*** острые заболевания, обострение хронических заболеваний, сильная реакция или осложнение на предыдущее введение, тяжелая системная аллергическая реакция на неомицин, стрептомицин и полимиксин В.
- Защищает ребенка от заболевания, но не исключает носительства вируса, что представляет опасность для окружающих.

Оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ)

- По национальному календарю рекомендован для проведения второй и третьей ревакцинации.
- Содержит ослабленный вирус.
- Позволяет формировать хорошую защиту слизистых оболочек и предупреждает носительство вируса.
- Вакцина вводится в рот, натошак, детям ранее привитым ИПВ.
- ***Вакцина хорошо переносится!*** Крайне редко отмечаются аллергические реакции и вакциноассоциированный полиомиелит, который может развиваться у детей ранее непривитых ИПВ и бывших в контакте с детьми, получившими ОПВ.
- ***Противопоказания:*** острые заболевания, обострение хронических заболеваний, сильная реакция или осложнение на предыдущее введение, иммунодефицитные состояния, беременность.